

des patients sur les conditions financières et les modalités de prise en charge des différents centres.

## D. Dépistage des patients avant et pendant l'AMP

### 1. Modalités de dépistage des patients potentiellement atteints

Les recommandations en matière de dépistage et de diagnostic du SARS-CoV-2 sont susceptibles d'évoluer rapidement. Il est conseillé de se conformer aux recommandations en vigueur.

Un **questionnaire d'orientation diagnostique (en Annexe 2), à réaliser tout au long du parcours, permet de moduler la prise en charge.** Il concerne les deux membres du couple.

Le Tableau 1 retrace les étapes successives du parcours, au cours desquelles chaque membre du couple devra répondre au questionnaire. La prise de température sera réalisée sur signe d'appel clinique (symptômes, frissons).

Tableau 1. *Étapes lors desquelles le questionnaire d'orientation diagnostique est réalisé : exemple pour une FIV.*

	Questionnaire (Annexe 2)
	Pour chaque membre du couple
2 semaines avant le début de la stimulation	+
Premiers jours de la stimulation	+
A chaque échographie de monitoring	+
Le jour du déclenchement	+
Le jour de la ponction/recueil de spermatozoïdes	+
Le jour du transfert d'embryon	+
15 jours après - une conservation de gamètes ou d'embryons - un transfert d'embryon (= jour du test hCG) - un premier test hCG +	+